




**Olimpiada Națională de Fizică  
Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017  
Proba teoretică**



**Barem de corectare**

*Subiectul I*

		Punctaj parțial	Punctaj
<b>A</b>	<b>Amestec de gaze</b>		
a)	Din		
	$v = \sum_{i=1}^N v_i,$	<b>0,5 p.</b>	
	adică		
	$\frac{m}{\mu} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{\mu_i},$		
	rezultă	<b>0,5 p.</b>	<b>2 p.</b>
	$\frac{1}{\mu} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{m \mu_i} = \sum_{i=1}^N \frac{w_i}{\mu_i},$		
	sau		
	$\mu = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{w_i}{\mu_i}}$	<b>1 p.</b>	
b)	Din		
	$m = \sum_{i=1}^N m_i,$	<b>0,5 p.</b>	
	rezultă		
	$\mu v = \sum_{i=1}^N \mu_i v_i,$	<b>0,5 p.</b>	<b>2 p.</b>
	sau		
	$\mu = \sum_{i=1}^N x_i \mu_i.$	<b>1 p.</b>	
<b>B.</b>	<b>Aer umed</b>		
c)	$p_a + p_v = H$ , unde $p_a$ este presiunea parțială a aerului uscat, iar $p_v$ este presiunea vaporilor. Din ecuația termică de stare scrisă pentru un volum $V$ de amestec rezultă $p_a V = \nu_a RT$ și $p_v V = \nu_v RT$ , rezultă		
	$\frac{p_a}{\nu_a} = \frac{p_v}{\nu_v} = \frac{p_a + p_v}{\nu_a + \nu_v} = \frac{H}{\nu}.$	<b>0,5 p.</b>	<b>1,0 p.</b>
	Fracția molară a vaporilor este		
	$x = x_v = \frac{\nu_v}{\nu} = \frac{p_v}{H} = \frac{h p_s}{H}.$	<b>0,5 p.</b>	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

XI

<b>d)</b>	$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{v_a C_{p_a} + v_v C_{p_v}}{v}}{\frac{v_a C_{V_a} + v_v C_{V_v}}{v}} = \frac{(1-x)C_{p_a} + xC_{p_v}}{(1-x)C_{V_a} + xC_{V_v}}$ <p>Dar</p> $\gamma_a = \frac{C_{p_a}}{C_{V_a}} \text{ și } \gamma_v = \frac{C_{p_v}}{C_{V_v}}$ <p>Din relațiile Mayer <math>C_{p_a} - C_{V_a} = C_{p_v} - C_{V_v} = R</math>,</p> <p>Găsim astfel <math>C_{p_a} = R \frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}</math> și <math>C_{V_a} = R \frac{1}{\gamma_a - 1}</math>.</p> <p>Analog pentru vapori, <math>C_{p_v} = R \frac{\gamma_v}{\gamma_v - 1}</math> și <math>C_{V_v} = R \frac{1}{\gamma_v - 1}</math>.</p> <p>Prin urmare</p> $\gamma = \frac{R(1-x) \frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1} + Rx \frac{\gamma_v}{\gamma_v - 1}}{R(1-x) \frac{1}{\gamma_a - 1} + Rx \frac{1}{\gamma_v - 1}} = \frac{(1-x) \frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1} + x \frac{\gamma_v}{\gamma_v - 1}}{(1-x) \frac{1}{\gamma_a - 1} + x \frac{1}{\gamma_v - 1}} = \frac{x+7}{x+5}$	<p><b>0,5 p.</b></p> <p><b>0,5 p.</b></p> <p><b>0,5 p.</b></p> <p><b>0,5 p.</b></p> <p><b>0,5 p.</b></p>	<b>3,0 p.</b>
<b>e)</b>	<p>Viteza de fază a sunetului este</p> $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$ <p>unde</p> $\mu = x\mu_v + (1-x)\mu_a$ <p>Prin urmare,</p> $v = \sqrt{RT \frac{\frac{(1-x) \frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1} + x \frac{\gamma_v}{\gamma_v - 1}}{(1-x) \frac{1}{\gamma_a - 1} + x \frac{1}{\gamma_v - 1}}}{x\mu_v + (1-x)\mu_a}} = \sqrt{RT \frac{x+7}{(x+5)(29-11x)}}$	<p><b>0,5 p.</b></p> <p><b>0,5 p.</b></p>	<b>1,0 p.</b>
	<b>Oficiu</b>		<b>1 p.</b>
	<b>Punctaj total</b>		<b>10 p.</b>

*Bareme propuse de:*  
**prof. Ion TOMA**, CN Mihai Viteazul, București  
**lect. univ. dr. Cornel Mironel NICULAE**, Universitatea din București  
**prof. dr. Constantin COREGA**, CN Emil Racoviță, Cluj-Napoca  
**conf. univ. dr. Sebastian POPESCU**, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
  2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
- Pagina 2 din 8*



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 – 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**



*Subiectul al II-lea*

A		Punctaj parțial	Punctaj
a)	<p style="text-align: center;">a) capăt fixat                      b) capăt liber</p> <p style="text-align: center;"><i>Figura 1.</i></p>	1p	1p
b)	<p>Unda se reîntoarce cu vârful ascuțit spre stânga și răsturnată.</p> <p>Unda <math>f</math> deplasată la dreapta cu <math>D - L</math> o notăm cu <math>h(x) = f(x - D + L)</math>.</p> <p>Unda reflectată complet, la momentul <math>t = D/v</math> este antisimetrica funcției <math>h</math> față de punctul de coordonate <math>(D - \frac{L}{2}, 0)</math>, adică <math>g(D - \frac{L}{2} + s) = -h(D - \frac{L}{2} - s)</math></p> <p>Substituind <math>x = D - \frac{L}{2} + s</math> în relația de mai sus rezultă <math>g(x) = -h(2D - L - x) = -f(D - x)</math>. Unda care se deplasează la stânga cu viteza <math>v</math> este <math>g(x + v(t - \frac{D}{v}))</math></p> <p>Expresia undei este <math>y(x, t) = -f(D - x - v(t - \frac{D}{v}))</math> sau:</p> <p style="text-align: center;"><math>y(x, t) = -f(2D - x - vt)</math>.</p>	0,25p  0,25	0,5p
c)	<p>Unda se reîntoarce cu vârful ascuțit spre stânga și nerăsturnată. Dacă ținem cont că unda reflectată este simetrica funcției <math>f</math> față de punctul de coordonată <math>D</math>, adică <math>g(D + s) = f(D - s)</math>. Rezultă <math>g(x) = f(2D - x)</math>.</p> <p>Unda ce se deplasează la stânga cu viteza <math>v</math> este <math>g(x + vt)</math>. Expresia undei este</p> <p style="text-align: center;"><math>y(x, t) = f(2D - x - vt)</math>.</p>	0,25p  0,25p	0,5p.

- Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
- Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

**XI**

<b>B</b>			
d)	<p style="text-align: center;">a) capăt fixat</p> <p style="text-align: center;">b) capăt liber</p>	3p.	3p.
<i>Figura 2.</i>			
e)	<p style="text-align: center;">a) <math>\tau_{k1} = \frac{L}{6v}</math></p> <p style="text-align: center;">b) <math>\tau_2 = 2\frac{L}{6v}</math></p>	3p.	3p.
<i>Figura 3.</i>			
f)	<p>în poziție verticală tensiunea în coarda elastică depinde de poziție conform:  <math>T(x) = \frac{M}{L}(L - x)g</math>. Expresia vitezei de fază devine:</p> $v = \sqrt{\frac{T(x)}{M/L}} = \sqrt{(L - x)g}$	1p	1p

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

**XI**

	$v = \sqrt{(L-x)g}$ . Identificăm $v = \sqrt{Lg - gx} \equiv \sqrt{v_0^2 + 2ax}$ și rezultă $a = -g/2$	0,5p.	
		0,5p	
<b>Oficiu</b>			1 p.
<b>Punctaj total</b>			10 p.

*Bareme propuse de:*

*prof. Ion TOMA, CN Mihai Viteazul, București*

*lect. univ. dr. Cornel Mironel NICULAE, Universitatea din București*

*prof. dr. Constantin COREGA, CN Emil Racoviță, Cluj-Napoca*

*conf. univ. dr. Sebastian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași*

- 
1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
  2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

XI

*Subiectul al III-lea*

A		Punctaj parțial	Punctaj
a)	$L = Fx_m - \Delta E_p = \Delta E_c = 0 \Rightarrow \frac{k_1 x_m}{2} = F \Rightarrow x_m = \frac{2F}{k_1}$	0,5p.	0,5p
b)	$ma = F - k_1 x = -k_1 \left( x - \frac{F}{k_1} \right)$ $\frac{k_1}{m} = \omega_1^2; x - \frac{F}{k_1} = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$ la $t = 0$ : $\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \Rightarrow -\frac{F}{k_1} = A_1 \sin \varphi_1 \\ v = 0 \Rightarrow 0 = \omega_1 A_1 \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow A_1 = -\frac{F}{k_1}$ Deci: $x(t) = \frac{F}{k_1} - \frac{F}{k_1} \sin\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{F}{k_1} (1 - \cos \omega_1 t)$ , sau $x(t) = \frac{F}{k_1} \left( 1 - \cos \sqrt{\frac{k_1}{m}} t \right) \Rightarrow$ $x(t) = \frac{F}{k_1} - \frac{F}{k_1} \sin\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} t + \frac{\pi}{2}\right)$ sau $x(t) = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_1} \sin\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} t - \frac{\pi}{2}\right)$ . Rezultă: $\omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m}}; A_1 = \pm \frac{F}{k_1}; \varphi_1 = \mp \frac{\pi}{2}; B_1 = \frac{F}{k_1}$ .	0,5p.  1p.  2p.  0,5p	
c)	La $t_1 = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k_1}} \Rightarrow \omega_1 t_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m}} \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k_1}} = \frac{\pi}{3}$ . Ecuația de mișcare este $ma = -k_1 x$ . Legea de mișcare o căutam de forma: $x(t) = A_2 \sin\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} t + \varphi_2\right)$ La $t = t_1$ , $x(t_1) = \frac{F}{k_1} \left( 1 - \cos \frac{\pi}{3} \right) = \frac{F}{2k_1}$ ; $v(t_1) = \frac{F}{k_1} \sqrt{\frac{k_1}{m}} \sin \sqrt{\frac{k_1}{m}} t_1 = \frac{F}{\sqrt{mk_1}} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{F}{2} \sqrt{\frac{3}{mk_1}}$ . Atunci $\left\{ \begin{array}{l} \frac{F}{2k_1} = A_2 \sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi_2\right) \\ \frac{F}{2} \sqrt{\frac{3}{mk_1}} = A_2 \sqrt{\frac{k_1}{m}} \cos\left(\frac{\pi}{3} + \varphi_2\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_2 \sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi_2\right) = \frac{F}{2k_1} \\ A_2 \cos\left(\frac{\pi}{3} + \varphi_2\right) = \frac{F\sqrt{3}}{2k_1} \end{array} \right\}$ $A_2 = \frac{F}{k_1}$ și $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi_2\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \varphi_2 = \frac{\pi}{6}$ sau $\frac{5\pi}{6}$ . Obs: $t_1 = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k_1}}; \omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m}} \Rightarrow T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1}} \Rightarrow \frac{t_1}{T_1} = \frac{1}{6} \Rightarrow t_1 = \frac{T_1}{6} \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \varphi_2 = \frac{\pi}{6} \Rightarrow$ $\varphi_2 = -\frac{\pi}{6}$ . Prin urmare: $x(t) = \frac{F}{k_1} \sin\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} t - \frac{\pi}{6}\right)$	0,5p.      0,5p.	1,5p

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

XI

<b>B</b>	<p><b>d)</b></p> <p><math>\tau = 2\Delta t_1 + 2\Delta t_2.</math></p> <p>Pentru deplasarea corpului pe distanța <math>OC=l</math> parcursă în intervalul <math>\Delta t_1</math> scriem ecuația:</p> <div style="text-align: center;"> </div> $ma = -k_1 x \quad \Rightarrow \quad x(t) = A_3 \sin\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} t + \varphi_3\right).$ <p>La <math>t = 0</math>, <math>\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \Rightarrow \sin \varphi_3 = 0 \Rightarrow \varphi_3 = 0 \\ v = v_0 \Rightarrow v_0 = A_3 \sqrt{\frac{k_1}{m}} \cos \varphi_3 \Rightarrow A_3 = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1}} \end{array} \right\} \Rightarrow</math></p> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <math display="block">x(t) = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1}} \sin \sqrt{\frac{k_1}{m}} t</math> </div> <p>La <math>t = \Delta t_1 \Rightarrow x(\Delta t_1) = l, \Rightarrow l = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1}} \sin \sqrt{\frac{k_1}{m}} \Delta t_1 \Rightarrow \sin \sqrt{\frac{k_1}{m}} \Delta t_1 = \frac{l}{v_0} \sqrt{\frac{k_1}{m}} \Rightarrow</math></p> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <math display="block">\Delta t_1 = \sqrt{\frac{m}{k_1}} \arcsin\left(\frac{l}{v_0} \sqrt{\frac{k_1}{m}}\right) = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{m}{k_1}}</math> </div> <p>Pentru deplasarea corpului pe distanța <math>CD</math>, de durată <math>\Delta t_2</math>, scriem ecuația:</p> $ma = -k_1 x - k_2(x - l) = -(k_1 + k_2)x + k_2 l = -(k_1 + k_2) \left(x - \frac{k_2 l}{k_1 + k_2}\right)$ $\omega_2 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \text{ și } x - \frac{k_2 l}{k_1 + k_2} = A_4 \sin(\omega_2 t + \varphi_4).$ <p>La <math>t = \Delta t_1</math>, <math>x = l</math> și <math>v(\Delta t_1) = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1}} \sqrt{\frac{k_1}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k_1}{m}} \Delta t_1\right) \Rightarrow</math></p> $v(\Delta t_1) = v_0 \cos\left[\arcsin\left(\frac{l}{v_0} \sqrt{\frac{k_1}{m}}\right)\right] = v_0 \sqrt{1 - \frac{k_1 l^2}{m v_0^2}}.$ <p>Deci la <math>t = \Delta t_1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l - \frac{k_2 l}{k_1 + k_2} = A_4 \sin(\omega_2 t + \varphi_4) \\ v_0 \sqrt{1 - \frac{k_1 l^2}{m v_0^2}} = \omega_2 A_4 \cos(\omega_2 t + \varphi_4) \end{array} \right\} \Rightarrow</math></p> $\left\{ \begin{array}{l} A_4 \sin(\omega_2 t + \varphi_4) = \frac{l k_1}{k_1 + k_2} \\ A_4 \cos(\omega_2 t + \varphi_4) = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}} \sqrt{1 - \frac{k_1 l^2}{m v_0^2}} \end{array} \right\} \Rightarrow$ $A_4 = \frac{\frac{l^2 k_1^2}{(k_1 + k_2)^2} + \frac{m v_0^2}{k_1 + k_2} \left(1 - \frac{k_1 l^2}{m v_0^2}\right)}{\sqrt{\frac{m v_0^2}{k_1 + k_2} - \frac{k_1 k_2 l^2}{(k_1 + k_2)^2}}} =$ $\frac{k_1 l}{k_1 + k_2} \sqrt{\frac{m v_0^2 (k_1 + k_2)}{k_1^2 l^2} - \frac{k_2}{k_1}} = \frac{2}{3} l.$ <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <math display="block">A_4 = \frac{2}{3} l</math> </div> $\omega_2 \Delta t_1 + \varphi_4 = \arcsin\left(\frac{k_1 l}{k_1 + k_2} \frac{1}{A_4}\right) = \arcsin\left(\frac{k_1 l}{k_1 + k_2} \frac{k_1 + k_2}{k_1 l} \frac{1}{\sqrt{\frac{m v_0^2 (k_1 + k_2)}{k_1^2 l^2} - \frac{k_2}{k_1}}}\right).$	0,5p.	
		0,5p.	
		1p.	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.  
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

Pagina 7 din 8



**Olimpiada Națională de Fizică**  
**Târgu Jiu, 24 - 29 aprilie 2017**  
**Proba teoretică**

XI

	$\Rightarrow \varphi_4 = \arcsin \frac{1}{\sqrt{\frac{mv_0^2}{k_1 l^2} \left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right) - \frac{k_2}{k_1}}} - \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}} \sqrt{\frac{m}{k_1}} \arcsin \left( \frac{l}{v_0} \sqrt{\frac{k_1}{m}} \right) \Rightarrow$ $\varphi_4 = \frac{\pi}{12} (2 - 3\sqrt{3})$ <p>La <math>\Delta t_1 + \Delta t_2 \Rightarrow v = 0 \Leftrightarrow 0 = A_4 \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}} \cos[\omega_2(\Delta t_1 + \Delta t_2) + \varphi_4] \Rightarrow</math></p> $\omega_2(\Delta t_1 + \Delta t_2) + \varphi_4 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi_4}{\omega_2} = \frac{\pi}{2\omega_2} - \frac{\varphi_4}{\omega_2} \Rightarrow$ $\tau = 2(\Delta t_1 + \Delta t_2) = \frac{\pi}{\omega_2} - \frac{2\varphi_4}{\omega_2} = \pi \sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}} - 2 \sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}} \varphi_4$ $= \pi \sqrt{\frac{m}{3k_1}} - 2 \sqrt{\frac{m}{3k_1}} \frac{\pi}{12} (2 - 3\sqrt{3}) \Rightarrow$ $\tau = \pi \sqrt{\frac{m}{3k_1}} \left( \frac{3\sqrt{3} + 4}{6} \right)$	<b>0,5p.</b>	
e)	$\bar{F} = \frac{\Delta p}{2\Delta t_2} = \frac{2mv_1}{2\Delta t_2} = \frac{mv_0 \sqrt{1 - \frac{k_1 l^2}{mv_0^2}}}{\pi \sqrt{\frac{m}{2k_1} \left( \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4} \right)}} = \frac{mv_0}{\pi} \sqrt{\frac{k_1}{m} \frac{12}{4 + 3(\sqrt{3} - \sqrt{2})}}$ $\bar{F} = \frac{mv_0^2}{\pi l} \frac{6\sqrt{2}}{4 + 3(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \Rightarrow$ $\bar{F} = \frac{kl}{\pi} \frac{12\sqrt{2}}{4 + 3(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$	<b>0,5p.</b>	<b>0,5p</b>
f)	$L = 2(\Delta x_1 + \Delta x_2).$ $\Delta x_1 = \frac{k_2 l}{k_1 + k_2} + A_4 = \frac{k_2 l}{k_1 + k_2} + \frac{k_1 l}{k_1 + k_2} \sqrt{\frac{mv_0^2}{k_1 l^2} \left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right) - \frac{k_2}{k_1}}$ $\Delta x_1 = \frac{2}{3} l + \frac{1}{3} l \sqrt{2 \cdot 3 - 2} = \frac{4l}{3}.$ $\frac{mv_0^2}{2} = \frac{k_1 (\Delta x_2)^2}{2} \Rightarrow$ $\Delta x_2 = v_0 \sqrt{\frac{m}{k_1}} = l\sqrt{2} \Rightarrow$ $L = 2 \left( \frac{4l}{3} + l\sqrt{2} \right)$ $L = 2l(4 + 3\sqrt{2})$	<b>0,5p.</b>	<b>1,5p</b>
	<b>Oficiu</b>		<b>1 p.</b>
	<b>Punctaj total</b>		<b>10 p.</b>

*Bareme propuse de:*

*prof. Ion TOMA, CN Mihai Viteazul, București*

*lect. univ. dr. Cornel Mironel NICULAE, Universitatea din București*

*prof. dr. Constantin COREGA, CN Emil Racoviță, Cluj-Napoca*

*conf. univ. dr. Sebastian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași*

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.